

สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด

สมุนไพรที่อาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาต้านเกล็ดเลือด


เกรปฟรุต (Grapefruit)

- อาจมีผล ลด ฤทธิ์ของยา Clopidogrel (โคลพิโดเกรว)
- อาจมีผล เพิ่ม ฤทธิ์ของยา Ticagrelor (ไทคากริลอร์)



เซนต์จอห์นเวิร์ต (St John's Wort)

- อาจมีผล ลด ฤทธิ์ของยา Ticagrelor (ไทคากริลอร์)
- อาจมีผล เพิ่ม ฤทธิ์ของยา Clopidogrel (โคลพิโดเกรว)



สารสกัดจากมะขาม (Tamarind)

- อาจ เพิ่ม ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากยา Aspirin (แอสไพริน) เช่น อาการเลือดออก คลื่นไส้ อาเจียน



สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- หลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการใช้สมุนไพรดังกล่าว หากท่านได้รับยาต้านเกล็ดเลือดอยู่
- หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สมุนไพรดังกล่าว ควรแจ้งให้แพทย์ที่รักษาทราบก่อน รวมถึงท่านควรทราบผลที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในผลของความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกที่เพิ่มขึ้นหรือผลที่ทำให้ประสิทธิภาพของยาต้านเกล็ดเลือดที่ลดลงทั้งนี้ขึ้นกับผลของสมุนไพรแต่ละชนิดดังที่กล่าวมา
- หากมีความประสงค์ที่ต้องการใช้สมุนไพรอื่นๆ ขณะที่ท่านได้รับยาต้านเกล็ดเลือดอยู่ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- หากสังเกตพบความผิดปกติระหว่างการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
- หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถสอบถามหน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 02-419-7007 ทั้งในและนอกเวลาราชการ

เอกสารอ้างอิง

1. www.micromedexsolutions.com
2. Stockley's Herbal Medicine Interaction. 1st ed. 2009. (จัดทำข้อมูล เดือนพฤษภาคม 2559)

โครงการพัฒนาชุดความรู้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

จัดทำโดย

- หน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

ที่ปรึกษา

- อาจารย์ นายแพทย์สงคราม โชติกอนนุชิต
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สนับสนุนการพิมพ์โดย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ออกแบบโดย งานสร้างเสริมสุขภาพ

ตรวจสอบเนื้อหาครั้งสุดท้ายปี พ.ศ. 2560
รหัสหน่วยงาน HP
สงวนลิขสิทธิ์โดย พ.ร.บ. การพิมพ์ 2537




ผ่านพ้นสุขภาพออนไลน์



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด



โดยความร่วมมือระหว่าง

- ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
- ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช
- งานสร้างเสริมสุขภาพ

SIPI HP1006160

สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด

ยาต้านเกล็ดเลือด(Antiplatelets)

เป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือดได้แก่

- Aspirin (แอสไพริน)
- Clopidogrel (โคลพิโดเกรว)
- Ticagrelor (ไทคากริลอร์)
- Ticlopidine (ทีโคลพิดิน)
- Cilostazol (ไซลอสตาซอล)
- Dipyridamole (ไดไพริดาโมล)

ข้อบ่งใช้

- ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง
- ป้องกันการเกิดซ้ำของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน

สมุนไพรที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออก เมื่อใช้ร่วมกับยาต้านเกล็ดเลือด

สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
(Andrographis)



เทียนสัตตบุชย์
(Anise)



สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด

รากแอสทรากาลัส
(Astragalus)



สาหร่ายทะเลแบลคเดอร์แวร์ค
(Bladderwrack)



ผลบิลเบอร์รี่
(Bilberry)



แบล็คเคอร์แรนท์
(Black currant)



สารสกัดจากพริก
(Capsaicin)



เหลียงซัวลย/ เล็บวิฬาร์
(Cat's claw)



สารสกัดจากขึ้นฉ่าย
(Celery)



น้ำมันกานพลู
(Clove oil)



สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด

สารสกัดจากขมิ้นชัน
(Curcumin)



น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
(Evening primrose)



สารสกัดจากกระเทียม
(Garlic)



สารสกัดจากขิง
(Ginger)



สารสกัดจากใบแปะก๊วย
(Ginkgo)



สารสกัดจากโสม
(Ginseng)



สารสกัดจากชะเอมเทศ
(Licorice)



น้ำมันปลา
(Fish oil)

